

## Introduction - Résolution d'équations algébriques

Soit le trinôme du second degré  $P(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 5$ .

Le discriminant de  $P$  est :  $\Delta = 9 - 10 = -1 < 0$ , donc  $P$  n'a pas de racine réelle.

**Imaginons** un instant que l'on puisse néanmoins écrire  $\sqrt{\Delta} = \sqrt{-1}$ , et donc les formules donnant les racines de  $P$  (qui ne sont donc sûrement pas réelles!) :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = -3 + \sqrt{-1}; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -3 - \sqrt{-1}$$

Alors,

$$\begin{aligned} P(x_1) = P(-3 + \sqrt{-1}) &= \frac{1}{2}(-3 + \sqrt{-1})^2 + 3(-3 + \sqrt{-1}) + 5 \\ &= \frac{1}{2}(9 - 6\sqrt{-1} + (\sqrt{-1})^2) - 9 + 3\sqrt{-1} + 5 \\ &= \frac{1}{2}(9 - 6\sqrt{-1} + (-1)) - 4 + 3\sqrt{-1} \quad (\text{car } \sqrt{-1}^2 = -1!) \\ &= 0 \end{aligned}$$

On calcule de même que  $P(x_2) = 0$ , et ainsi, ce trinôme du second degré admet bien deux racines distinctes, mais celles-ci ne sont pas réelles.

Le nombre  $\sqrt{-1}$  n'existe pas : ce n'est pas un nombre réel. Cardan, mathématicien du XVI<sup>ème</sup> siècle appelait ce type de nombre des nombres "impossible".

Plus tard, Descartes leur donna le nom de nombre "imaginaire", qui sont devenus aujourd'hui des nombres complexes.

## 1 Le plan complexe

**Théorème** (*admis*)

Il existe un ensemble noté  $\mathbb{C}$ , appelé **ensemble des nombres complexes**, qui possède les propriétés suivantes :

- $\mathbb{C}$  contient l'ensemble des nombres réels :  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$
- il existe un nombre complexe, noté  $i$  tel que  $i^2 = -1$ .
- tout nombre complexe  $z$  s'écrit de manière **unique** sous la forme  $z = x + iy$ , où  $x$  et  $y$  sont des nombres réels.

Ex :  $z = 3 + 2i \in \mathbb{C}$ ;  $z_2 = -5 \in \mathbb{R}$ , donc  $z_2 \in \mathbb{C}$ ;  $z_3 = \sqrt{7} - 6i \in \mathbb{C}$ ; ...

**Définition** L'écriture  $z = x + iy$ , où  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$  s'appelle la **forme algébrique** du nombre complexe  $z$ .

$x$  est la partie réelle de  $z$ , notée  $\Re(z)$ , et  $y$  est la partie imaginaire de  $z$ , notée  $\Im(z)$ .

Si  $y = 0$ , alors  $z$  est réel ( $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ )

Si  $x = 0$ ,  $z$  est dit imaginaire pur.

Ex :

- $z = 3 - 2i$ ,  $\Re(z) = 3$  et  $\Im(z) = -2$ .
- $z = -1 + i$ ,  $\Re(z) = -1$  et  $\Im(z) = 1$ .
- $z = \frac{1}{2}i$ ,  $\Re(z) = 0$  et  $\Im(z) = \frac{1}{2}$ ;  $z$  est imaginaire pur.

- $z = 12$ ,  $\Re(z) = 12$  et  $\Im(z) = 0$ ;  $z$  est réel.

D'après le premier théorème, on a alors :

**Propriété** Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire : soit  $z = x + iy$  et  $z' = x' + iy'$ , avec  $x, y, x'$  et  $y'$  quatre nombres réels, alors,


$$z = z' \iff (x = x' \text{ et } y = y')$$

**Définition** (Plan complexe)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  direct.

A tout nombre complexe  $z = x + iy$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$ , on associe le point  $M$  de coordonnées  $M(x; y)$ .

On dit que  $z$  est l'affixe du point  $M$ , ou du vecteur  $\vec{OM}$ ; et que le point  $M$ , ou le vecteur  $\vec{OM}$  est l'image de  $z$ .



**Définition** Les nombres réels sont les affixes des points de l'axe des abscisses, que l'on appelle donc **axe réel**.

Un nombre complexe dont la partie réelle est nulle,  $z = 0 + iy = iy$  est appelé un nombre **imaginaire pur**. Les images de ces nombres sont les points de l'axe des ordonnées, que l'on appelle donc **axe imaginaire (pur)**.

**Exercice 1** Placer les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :  $z_A = -1 - 2i$ ,  $z_B = 4 - i$  et  $z_C = \sqrt{2} + \frac{3}{2}i$ . Déterminer les longueurs  $OA, OB$  et  $OC$  et  $AB$ .

## 2 Opérations sur les nombres complexes

### 2.1 Opérations numériques et algébriques

Les règles de calcul sur les nombres réels se prolongent aux nombres complexes.

**Exercice 2** Exprimer sous forme algébrique les nombres complexes :

- $(2 + 3i) + (-1 + 6i)$
- $(5 + i) - (3 - 2i)$
- $(1 + i)(3 - 2i)$
- $(4 + i)(-5 + 3i)$
- $(2 - i)^2$
- $(x + iy)(x' + iy')$
- $(x + iy)^2$
- $(2 - 3i)(2 + 3i)$
- $(a + ib)(a - ib)$


**Exercice 3** On pose  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ . Calculer  $1 + j + j^2$ .

### 2.2 Opérations géométriques

**Propriété** Soit  $z_1 = a + ib$  et  $z_2 = a' + ib'$  deux nombres complexes, avec  $a, b, a'$  et  $b'$  quatre réels, et  $M$  et  $N$  leur image respective dans le plan complexe.

Alors  $z = z_1 + z_2 = (a + a') + i(b + b')$  a pour image le point  $P$  tel que  $\vec{OP} = \vec{OM} + \vec{ON}$ .

De même, le vecteur  $\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM}$  a pour affixe le complexe  $z_{\vec{MN}} = z_2 - z_1$ .



**Propriété** Soit deux points  $A$  et  $B$  d'affixe  $z_A$  et  $z_B$ , alors l'affixe du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est  $z_B - z_A$ .  
 Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs d'affixe  $z$  et  $z'$ , alors le vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$  a pour affixe  $z + z'$ .  
 Si  $k \in \mathbb{R}$ , le vecteur  $k\vec{u}$  a pour affixe  $kz$ .  
 Le milieu  $z_I$  du milieu  $I$  segment  $[AB]$  est  $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$ .

**Exercice 4** Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ont pour affixes respectives  $-2 + i$ ,  $3 + 3i$ ,  $1 + \frac{11}{5}i$ .

- Calculer les affixes des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
- En déduire que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.
- Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .

**Exercice 5** Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ont pour affixes respectives  $1 + \frac{1}{2}i$ ,  $\frac{3}{2} + 2i$  et  $-1 - \frac{11}{2}i$ .  
 Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le plan complexe, et montrer qu'ils sont alignés.

**Exercice 6** On considère dans le plan complexe les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  d'affixe  $z_A = 3 + i$ ,  $z_B = 2 - 2i$ ,  $z_C = 2i$  et  $z_D = 1 + 5i$ .

- Faire une figure
- Montrer de deux façons différentes que  $ABCD$  est un parallélogramme.

### 3 Conjugué d'un nombre complexe

**Définition** Soit  $z = x + iy$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$ , un nombre complexe. On appelle **conjugué** de  $z$ , noté  $\bar{z}$ , le nombre complexe  $\bar{z} = x - iy$ .

**Propriété** Dans le plan complexe, si le point  $M$  a pour affixe  $z$ , alors l'image  $M'$  de  $\bar{z}$  est la symétrique de  $M$  par rapport à l'axe des abscisses.

**Ex :** •  $z = 3 + 2i$ , alors  $\bar{z} = 3 - 2i$ .      •  $\overline{3 - \frac{1}{2}i} = 3 + \frac{1}{2}i$       •  $\overline{-5} = -5$       •  $\overline{3i} = -3i$

**Propriété**

- $\overline{\bar{z}} = z$       •  $z\bar{z} = x^2 + y^2$       •  $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$       •  $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- si  $z \neq 0$ ,  $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$       • si  $z' \neq 0$ ,  $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$
- $z + \bar{z} = 2\Re(z)$  et donc,  $z$  imaginaire pur  $\iff \Re(z) = 0 \iff z = -\bar{z}$
- $z - \bar{z} = 2i\Im(z)$ , et donc,  $z \in \mathbb{R} \iff \Im(z) = 0 \iff z = \bar{z}$

**Exercice 7** Soit les nombres complexes :  $z_1 = \frac{3 - i}{5 + 7i}$  et  $z_2 = \frac{3 + i}{5 - 7i}$ .  
 Vérifier que  $z_1 = \bar{z}_2$ , et en déduire que  $z_1 + z_2$  est réel et que  $z_1 - z_2$  est imaginaire pur.  
 Calculer  $z_1 + z_2$  et  $z_1 - z_2$ .

**Exercice 8** Soit  $P$  le polynôme défini sur  $\mathbb{C}$  par :  $P(z) = z^3 + z^2 - 4z + 6$ .

- Montrer que pour tout complexe  $z$ ,  $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$ .
- Calculer  $(1 + i)^2$  puis  $(1 + i)^3$  et vérifier que  $1 + i$  est une racine de  $P$ , et en déduire une autre racine complexe de  $P$ .

**Exercice 9** Déterminer l'ensemble des points  $M$  d'affixe  $z$  du plan complexe tels que  $Z = z^2 + \bar{z}$  soit un nombre réel (on pourra poser  $z = x + iy$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$ , et écrire  $Z$  sous forme algébrique).

**Exercice 10** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations (écrire la solution sous forme algébrique) :

a)  $5\bar{z} = 4 - i$     b)  $(1 + i)\bar{z} + 1 - i = 0$     c)  $2\bar{z} + i = z + 2$     d)  $3\bar{z} - 2iz = 5 - 3i$

**Propriété** (*Inverse d'un nombre complexe*)

Tout nombre complexe non nul  $z$  admet un inverse, noté  $\frac{1}{z}$ .

Démonstration: Soit  $z = x + iy$  un nombre complexe non nul, c'est-à-dire  $x \neq 0$  et  $y \neq 0$ .

Alors,  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{1}{x + iy} = \frac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i\frac{y}{x^2 + y^2}$  avec  $x^2 + y^2 \neq 0$  □

**Propriété** (*Quotient de deux nombres complexes*) Le quotient des deux nombres complexes  $z_1$  et  $z_2 \neq 0$ , est  $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \times \frac{1}{z_2} = \frac{z_1 \times \bar{z}_2}{z_2 \times \bar{z}_2}$ .

**Exercice 11** Ecrire sous forme algébrique ( $x + iy$ ) les nombres complexes :

- $\frac{1}{3 + 2i}$
- $\frac{1 + i}{3 - 2i}$
- $\frac{1 + 4i}{1 - 2i}$
- $\frac{2i}{2i - 1}$
- $(2 + 3i)(5 - i) + \left(\frac{1}{2} + 3i\right)^2$
- $i^3$
- $\frac{1}{i}$
- $i^4$
- $i^5$
- $i^6$
- $\frac{3}{i^{10}}$

**Exercice 12** Soit  $z_1 = -1 + 3i$  et  $z_2 = 4 - i$ . Ecrire sous forme algébrique les nombres complexes :


- $z_1^2 - 2z_2$
- $z_1 z_2^2$
- $\frac{z_1}{z_2}$
- $\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$

## 4 Module et argument d'un nombre complexe

**Définition** Soit dans le plan complexe un point  $M$  d'affixe  $z = x + iy$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $y \in \mathbb{R}$ .

Alors,  $OM = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}$ . Ce nombre, **réel et positif**, s'appelle le **module** du nombre complexe  $z$ , et est noté  $|z| = OM = \sqrt{x^2 + y^2}$ .

On appelle **argument** du nombre complexe non nul  $z$ , noté  $\arg(z)$ , toute mesure en radians de l'angle orienté :  $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ .



**Remarque** : • Un nombre complexe non nul  $z$  a une infinité d'arguments : si  $\theta$  est un de ces arguments, alors tous les autres sont de la forme  $\theta + k2\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

On note  $\arg(z) = \theta$  (modulo  $2\pi$ ), ou  $\arg(z) = \theta [2\pi]$ , ou encore, pour simplifier (mais alors par abus de langage),  $\arg(z) = \theta$ .


• Si  $z$  est un réel ( $z = x + i \times 0$ ), alors  $|z| = |x|$  : le module coïncide avec la valeur absolue pour les nombres réels.

Par exemple,  $|6| = \sqrt{6^2} = 6$ , et  $|-3| = \sqrt{(-3)^2} = 3$ .

**Exercice 13** Calculer les modules des nombres complexes suivants :  $z_1 = 1 + 2i$ ,  $z_2 = 2 - 3i$ ,  $z_3 = -1 - 5i$ ,  $z_4 = 3$ ,  $z_5 = -6$ ,  $z_7 = 8i$ ,  $z_8 = -3i$ ,  $z_9 = \sqrt{3} + i$

**Propriété** Soit  $A(z_A)$  et  $B(z_B)$ , alors  $\overrightarrow{AB}(z_B - z_A)$  et donc,

- $AB = \|\overrightarrow{AB}\| = |z_B - z_A|$
- $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_{\overrightarrow{AB}}) = \arg(z_B - z_A)$ .



**Exercice 14** Déterminer l'ensemble des nombres complexes  $z$  tels que :

- $\arg(z) = \frac{\pi}{6}$
- $|z - 3| = |z + 2i|$
- $|z + 1 - 2i| < \sqrt{5}$
- $\arg(z + i) = \pi$

**Exercice 15** Dans le plan complexe,  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont les points d'affixes :

$$z_A = 1 + i, \quad z_B = 4 + 5i, \quad z_C = 5 - 2i.$$

1. Montrer que  $AB = AC$ .
2. a) Déterminer l'affixe du point  $G$  tel que le quadrilatère  $AGBC$  soit un parallélogramme.  
b) Déterminer les affixes des points  $I$  et  $J$ , milieux respectifs de  $[GC]$  et  $[AB]$ .

**Propriété** Pour tout nombres complexes  $z$  et  $z'$  :

- si  $z = x + iy$ ,  $x \in \mathbb{R}$  et  $y \in \mathbb{R}$ ,  $z\bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2$
- $|-z| = |z|$       •  $|\bar{z}| = |z|$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$  (inégalité triangulaire)
- $|zz'| = |z||z'|$       •  $|z^n| = |z|^n$       •  $\frac{|z|}{|z'|} = \left| \frac{z}{z'} \right|$

**Exercice 16** Calculer le module des nombres complexes suivants :

- a)  $z = \frac{1+i}{3-4i}$     b)  $z = (2+2i)(-1+i)$     c)  $z = \frac{i(-1-i)}{-3+4i}$     d)  $z = \frac{-4(2-i)}{2i(1+2i)}$

## 5 Forme trigonométrique d'un nombre complexe

**Définition** Dans le plan complexe un point  $M$  peut-être repéré par ses coordonnées cartésiennes  $(x; y)$ , ou son affixe complexe  $z = x + iy$ , ou par ses coordonnées polaires  $(r; \theta)$ , avec  $r = OM$  et  $\theta = (\vec{u}; \overrightarrow{OM})$ .


On a les relations :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{r}, \sin \theta = \frac{y}{r} \end{cases} \iff \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

L'affixe  $z$  du point  $M$  s'écrit alors,

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Cette écriture est la **forme trigonométrique** de  $z$ .



**Exercice 17** Ecrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

- $z_1 = 3$
- $z_2 = -4$
- $z_3 = 2i$
- $z_4 = -1 + i$
- $z_5 = -\sqrt{3} + i$
- $z_6 = -6\sqrt{3} + 6i$
- $z_7 = \sqrt{6} + i\sqrt{2}$ .

## 6 Equation du second degré

**Propriété** Soit  $a$  un nombre réel. Les solutions de l'équation  $z^2 = a$  sont appelées racines carrées de  $a$  dans  $\mathbb{C}$ , avec

- si  $a \geq 0$ , alors  $z = \sqrt{a}$  ou  $z = -\sqrt{a}$  (deux racines réelles)
- si  $a < 0$ , alors  $z = i\sqrt{-a}$  ou  $z = -i\sqrt{-a}$  (deux racines complexes, imaginaires pures)

Démonstration : • Si  $a \geq 0$ , alors  $z^2 = a \iff (z - \sqrt{a})(z + \sqrt{a}) = 0$ , d'où les racines de l'équation.

• Si  $a < 0$ ,  $z^2 = a \iff z^2 - i^2(-a) = z^2 - i^2(\sqrt{-a})^2 = 0 \iff (z - i\sqrt{-a})(z + i\sqrt{-a}) = 0$ , d'où les racines complexes.

Ex : Les racines carrées de 2 dans  $\mathbb{C}$  sont  $\sqrt{2}$  et  $-\sqrt{2}$ , qui sont réelles; les racines carrées de  $-4$  dans  $\mathbb{C}$  sont  $i\sqrt{4} = 2i$  et  $-i\sqrt{4} = -2i$ .

**Propriété** L'équation  $az^2 + bz + c = 0$ , où  $a \neq 0$ ,  $b$  et  $c$  sont trois réels, de discriminant  $\Delta = b^2 - 4ac$  admet :

- si  $\Delta = 0$ , une solution réelle double  $z = -\frac{b}{2a}$
- si  $\Delta > 0$ , deux solutions réelles distinctes  $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$  et  $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ .
- si  $\Delta < 0$ , deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Dans tous les cas, le trinôme du second degré se factorise selon (avec éventuellement  $z_1 = z_2$ ) :  
 $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$ .

**Exercice 18** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  les équations suivantes :

- $z^2 + z + 1 = 0$
- $z^2 - 3z + 18 = 0$
- $z^2 + 9z - 4 = 0$
- $-z^2 + (1 + \sqrt{3})z - \sqrt{3} = 0$

**Exercice 19** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^4 + 4z^2 - 21 = 0$ .

**Exercice 20** Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation :  $z^4 + 5z^2 - 36 = 0$ .

**Exercice 21** On considère le polynôme  $P$  défini sur  $\mathbb{C}$  par  $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4z + 3$ .

- a) Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que, pour tout complexe  $z$ ,  $P(z) = (z^2 + 1)(az^2 + bz + c)$ .
- b) En déduire toutes les solutions dans  $\mathbb{C}$  de l'équation  $P(z) = 0$ .

**Exercice 22** Soit  $P$  le polynôme défini par :  $P(z) = z^3 - (2 + i)z^2 + 2(1 + i)z - 2i$ .

1. Calculer  $P(i)$ .
2. Trouver deux nombres réels  $p$  et  $q$  tels que  $P(z) = (z - i)(z^2 + pz + q)$ .
3. Déterminer alors toutes les solutions de l'équation  $P(z) = 0$ .
4. Montrer que ces solutions sont les affixes des sommets d'un triangle rectangle.

**Exercice 23** Soit le polynôme  $P$  défini sur  $\mathbb{C}$  par :  $P(z) = 3z^3 + (1 + 6i)z^2 + 2(8 + i)z + 32i$ .

- a) Vérifier que  $z_0 = -2i$  est une racine de  $P$ .
- b) Trouver les nombres réels  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que, pour tout complexe  $z$ ,  $P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$ .
- c) Déterminer alors toutes les racines de  $P$ .

**Exercice 24** Soit les nombres complexes  $z_1 = -1 - i\sqrt{3}$  et  $z_2 = iz_1$ .

1. Ecrire  $z_1$  et  $z_2$  sous forme trigonométrique.
2. a) Placer dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  les points  $M_1$  et  $M_2$  d'affixes  $z_1$  et  $z_2$ .  
b) Soit  $A$ ,  $B$  et  $C$  les points du plan d'affixes respectives  $z_A$ ,  $z_B$  et  $z_C$  telles que  $z_A = -2 + 2i\sqrt{3}$ ,  $z_B = 2 - 2i\sqrt{3}$  et  $z_C = 8$ .  
Montrer que  $z_A = 2\overline{z_1}$ .
3. a) Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans le plan complexe.  
b) Calculer  $|z_A - z_B|$ ,  $|z_B - z_C|$  et  $|z_A - z_C|$ .  
c) En déduire que le triangle  $ABC$  est rectangle.