


Compléments sur les fonctions


Convexité

Terminale générale
spécialité maths

Table des matières



I	Continuité	2
1)	Rappels sur la continuité	2
2)	Théorèmes des valeurs intérieures	2
II	Dérivabilité	3
1)	Rappels sur la dérivabilité et tangente	3
2)	Approximation affine	4
3)	Étude et extrema d'une fonctions	5
III	Compléments sur l'étude de fonctions - Convexité	6



Exercice 1 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$ par l'expression : $f(x) = \frac{x}{x^2 - 2x + 1}$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. Interpréter graphiquement.
2. Dresser le tableau de variation de f .
3. Déterminer l'équation de la tangente T_0 au point d'abscisse 0.
4. Tracer T_0 et \mathcal{C}_f (avec tous les éléments graphiques trouvés précédemment).

I Continuité

1) Rappels sur la continuité

Définition Une fonction f est dite continue en un point a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Une fonction est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I .

Graphiquement, une fonction f continue sur I a une courbe représentative en "un seul morceau", c'est-à-dire qu'on peut tracer sa courbe sans lever le stylo.

On a vu la propriété suivante, qui permet de montrer qu'une fonction est continue à partir de la continuité des fonctions usuelles :

- Propriété** • Les fonctions usuelles (polynômes, fonctions rationnelles, racine carrée, exponentielle, cos et sin) sont continues sur leur ensemble de définition.
- La somme, le produit, le quotient et la composée de fonctions continues est une fonction continue sur tout intervalle sur lequel elle est définie.

Convention : On convient que, dans un tableau de variation, une flèche oblique indique que la fonction est **continue et strictement monotone** sur l'intervalle considéré.

Exemples : Par exemple, $f : x \mapsto x^2 + 3x + e^x - \frac{1}{x}$ est définie sur \mathbb{R}^* et y est continue en tant que somme de fonctions continues.

De même, $g : x \mapsto e^{3x^2-1}$ est continue car composée d'une fonction polynôme et de la fonction exponentielle qui sont continues sur \mathbb{R} .

2) Théorèmes des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires (1)

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I , et soit $a \in I$ et $b \in I$.

Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que $f(c) = k$.

En d'autres termes, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution c entre a et b .

Remarque : On peut avoir $a = -\infty$ et/ou $b = +\infty$; dans ce cas, on doit simplement remplacer $f(a)$ et/ou $f(b)$ dans le théorème précédent par la limite de f en $\pm\infty$.

Théorème des valeurs intermédiaires (2) - Théorème de la bijection

Soit f une fonction définie, continue et strictement monotone sur $[a; b]$; alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un unique réel c dans $[a; b]$ tel que $f(c) = k$.

En d'autres termes, l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution c sur $[a; b]$.

Remarque/définition : On dit dans ce cas que f réalise une bijection de $[a; b]$ dans $[f(a); f(b)]$:

la fonction f fait correspondre à chaque nombre de $[a; b]$ un, et un seul, nombre de $[f(a); f(b)]$.

En particulier, il y a ainsi, exactement le même nombre d'éléments dans l'intervalle de départ que dans son image.

Exercice 2 On donne ci-contre le tableau de variation d'une fonction f .

Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$. (on justifiera le résultat).

x	$-\infty$	2	10	$+\infty$
		8		$+\infty$
f	3	↗	↘	↗
			0	

Exercice 3 Démontrer que l'équation $x^3 + 3x = 5$ admet une unique solution sur \mathbb{R} .

Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de cette solution.

Exercice 4 Démontrer que l'équation $e^x = 2$ admet une unique solution sur \mathbb{R} .

Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de cette solution.

Exercice 5 On considère la fonction h définie sur $] -1; +\infty[$ par $h(x) = 2x - 3 + \sqrt{x+1}$.

1. Donner le tableau de variations de h .
2. En déduire que l'équation $\sqrt{x+1} = 3 - 2x$ admet une unique solution α dans $[-1; +\infty[$.
3. Donner une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

II Dérivabilité


1) Rappels sur la dérivabilité et tangente

Définition Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On appelle **taux de variation** en $a \in I$, le nombre $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
- La fonction f est dérivable en a si la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation existe. Dans ce cas, la limite est le **nombre dérivé de f en a** , noté $f'(a)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

- Une fonction est dérivable sur un intervalle I si elle est dérivable en tout réel x de I . On appelle alors **fonction dérivée de f** la fonction $x \mapsto f'(x)$.



Le taux de variation est le coefficient directeur de la corde (AM) :

$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Lorsque h tend vers 0, le point M tend vers le point A , et la corde (AM) "tend vers" la tangente à \mathcal{C}_f en A ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = f'(a)$$

le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à \mathcal{C}_f au point d'abscisse a .

Autres notations On note souvent avec un " Δ " les variations, ainsi le coefficient directeur d'une droite passant par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ s'écrit selon la formule : $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Le taux de variation de la fonction au point d'abscisse x s'écrit, selon cette notation, $\tau = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x}$.

La dérivée $f'(x)$ s'obtient en étudiant la limite du taux de variation lorsque $\Delta x \rightarrow 0$, ce que l'on note encore : $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$ qui se lit, "la dérivée de f par rapport à x ".

Cette notation a été en premier introduite par Leibniz (1646-1716), mathématicien, physicien, logicien, philosophe, diplomate, homme de loi, allemand (ainsi que les termes de "fonction", "coordonnées", du symbole intégral " \int_a^b ", et des concepts de continuité et d'énergie cinétique (force vive), entre autres...

Exercice 6 Soit la fonction f définie par l'expression $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

Montrer que f est dérivable en $x = 2$ et en déduire $f'(2)$.

Déterminer directement la fonction dérivée f' de f , et retrouver le résultat précédent.

Exercice 7 Soit la fonction h définie sur \mathbb{R}^+ par $h(x) = \sqrt{x}$.


Montrer que la fonction h n'est pas dérivable en 0. Interpréter graphiquement le résultat précédent.

Exercice 8 Montrer que la fonction $k : x \mapsto \frac{x\sqrt{x}}{1+x}$ est dérivable en 0. Que vaut $k'(0)$?

Exercice 9 **Pente sur un toboggan**

La pente à une courbe en un point est la pente en ce point de sa tangente, ou encore le coefficient directeur de cette tangente.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} - 2x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



1. Justifier que f est continue sur $[0; 2]$.
2. Donner une expression de la fonction dérivée f' de f . Montrer que f' est aussi continue sur $[0; 2]$. Interpréter graphiquement cette propriété.
3. Donner la pente à la courbe en 0 et en 2.
4. Donner la pente de la courbe au point d'abscisse x . Comment varie cette pente ? Dresser son tableau de variation.
5. Une norme impose que la pente d'un tel toboggan ne dépasse pas 1,5 en valeur absolue. Est-ce le cas ici ?

2) Approximation affine


La tangente est "la droite la plus proche de C_f " au voisinage de a .

Soit $\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$ telle que, d'après ce qui précède,

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0.$$

On a alors l'expression de $f(x)$:

$$f(x) = \underbrace{f(a) + (x - a)f'(a)}_{\text{équation de la tangente}} + (x - a)\varphi(x)$$



Propriété Soit une fonction dérivable en a , alors C_f admet une tangente au point d'abscisse a d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Théorème Une fonction dérivable en un réel a est continue en a .

Démonstration: D'après ce qui précède, si f est dérivable en a , alors, avec φ telle que $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = 0$
 $f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)\varphi(x)$, et donc, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. \square

Attention! la réciproque est fautive : une fonction peut-être continue mais non dérivable en a .

Par exemple, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto |x|$ sont continues en $x = 0$ mais ne sont pas dérivables en $x = 0$.

3) Étude et extrema d'une fonctions

Propriété Le signe de la dérivée d'une fonction donne son sens de variation, si $f'(x) \geq 0$ sur une intervalle I alors f croissante sur I , tandis que si $f'(x) \leq 0$ sur I alors f est décroissante sur I .

Corollaire Si une fonction f dérivable sur I admet un extremum en $x_0 \in I$, alors $f'(x_0) = 0$.

La réciproque est fautive. La dérivée d'une fonction peut s'annuler sans que cela ne corresponde à un extremum pour la fonction.

Par exemple, soit $f : x \mapsto x^3$, vérifie $f'(0) = 0$, mais $f(0)$ n'est pas un extremum pour la fonction cube (qui est strictement croissante sur \mathbb{R}).

Exercice 10 Déterminer les extrema de $f : x \mapsto x + \frac{2}{x}$.

Exercice 11 f est définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4$. Montrer que -6 est un minorant de f sur \mathbb{R}_+ .

Exercice 12 f_m est la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ par : $f_m(x) = \frac{x^2 + mx}{x^2 - 1}$, où m est un réel.

Pour quelles valeurs de m , f_m n'admet-elle ni maximum ni minimum ?

Exercice 13 On note (E) l'équation $x^3 - 15x - 4 = 0$ et (I) l'inéquation $x^3 - 15x - 4 > 0$.

1. Résolution graphique

a) Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation $x^2 - 15 = \frac{4}{x}$

b) Tracer dans un même repère les courbes représentatives des fonctions $x \mapsto x^2 - 15$ et $x \mapsto \frac{4}{x}$.

c) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation (E) .

Une des solutions est un nombre entier, quelle est sa valeur ?

Encadrer chacune des autres solutions α et β (avec $\alpha < \beta$) par deux entiers consécutifs.

d) Démontrer que l'inéquation (I) s'écrit sur $]0; +\infty[$, $x^2 - 15 > \frac{4}{x}$, et sur $] - \infty; 0[$, $x^2 - 15 < \frac{4}{x}$.

2. Etude d'une fonction f est définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 - 15x - 4$. \mathcal{C}_f est sa courbe représentative.

a) Justifier la continuité de f sur \mathbb{R} .

b) Etudier les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.

c) Déterminer les variations de f et dresser son tableau de variations. Tracer l'allure de \mathcal{C}_f .

e) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans \mathbb{R} .

f) Donner un encadrement à 10^{-2} près de chacune des solutions.

g) Etudier le signe de la fonction f . En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) .

3. Méthode algébrique

a) Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout réel x , $x^3 - 15x - 4 = (x - 4)(ax^2 + bx + c)$.

b) Résoudre alors (E) et (I) .

Exercice 14 f est la fonction polynôme définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2 + 4x$.

1. Calculer la dérivée f' de la fonction f , puis sa dérivée seconde f'' .

2. a) Déterminer les variations de la fonction f' , et dresser le tableau de variation de f' .

b) Prouver que l'équation $f'(x) = 0$ admet une solution unique c et que cette solution appartient à l'intervalle $] - \infty; -1]$. Donner un encadrement de c d'amplitude 10^{-2} .

3. a) Déterminer le signe de la fonction f' , puis dresser le tableau de variation de la fonction f .

b) Montrer que $f(c) = \frac{3c(4-c)}{4}$

c) Déterminer le nombre de racines du polynôme f .

III Compléments sur l'étude de fonctions - Convexité

Exercice 15 Des calculs de dérivées ... et des dérivées de dérivées

Calculer la dérivée f' puis la dérivée seconde $f'' = (f')'$ des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}x^2 + 3$

b) $f(x) = e^{2x+1}$

c) $f(x) = e^{-x^2}$

d) $f(x) = \frac{e^x}{x}$

Exercice 16 Position relative de deux courbes.

1. Représenter graphiquement la courbe de la fonction $f : x \mapsto x^2$ et la droite $d : y = x + 1$. Étudier la position relative de la courbe et de la droite.

2. Étudier la position relative des courbes des fonctions $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$ et $g : x \mapsto \frac{x}{x-1}$.

Étudier les variations (en précisant les limites et éventuelles asymptotes) de ces fonctions et tracer les deux courbes.

3. Étudier la position relative de la courbe de la fonction $f : x \mapsto e^x$ et de la droite $y = x$. Représenter graphiquement la situation.

Exercice 17 Retour sur la fonction carré et sa parabole

On considère la fonction carré $f : x \mapsto x^2$ définie sur \mathbb{R} . On note \mathcal{C} sa courbe et T_a la tangente à sa courbe au point d'abscisse a .

a) Donner l'équation de la tangente T_1 puis étudier la position relative de la courbe \mathcal{C} avec cette tangente.


b) Étudier de même la position relative de la courbe \mathcal{C} avec ses tangentes T_2 , T_0 , et T_{-1} .

c) Tracer dans un repère la courbe \mathcal{C} et ses tangentes.

d) Généraliser les résultats précédents : montrer que \mathcal{C} est toujours au-dessus de toutes ses tangentes T_a .

Définition On dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle I lorsque sa courbe représentative est située au-dessus de ses tangentes.

Par exemple (démontré dans l'exercice précédent), la fonction carré est une fonction convexe :



Propriété Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle I . Les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe sur I
2. la courbe représentative est entièrement située au-dessus de ses tangentes
3. f' est croissante sur I
4. f'' est positive sur I

Démonstration: L'équivalence entre 1. et 2. est la définition, celle entre 3. et 4. provient simplement du lien entre le sens de variation d'une fonction (ici f') et de sa dérivée (donc $(f')' = f''$).

Supposons que la dérivée seconde de f est positive, c'est-à-dire que, pour tout $x \in I$, on a $f''(x) \geq 0$. L'équation de la tangente T_a à la courbe de f en $x = a$ est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

On cherche à montrer que f est convexe donc que sa courbe est au-dessus de T_a , pour tout $a \in I$.

Pour étudier cette position relative, on définit la fonction

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x) - y \\ &= f(x) - \left(f'(a)(x - a) + f(a) \right)\end{aligned}$$

et on cherche donc à montrer qu'elle est positive.

Pour étudier cette fonction, on calcule sa dérivée, et même dérivée seconde :

$$\varphi(x) = f(x) - f'(a)x + f'(a)a + f(a)$$

donc

$$\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$$

puis

$$\varphi''(x) = f''(x)$$

Ainsi, $\varphi'' = f'' \geq 0$ par hypothèse, et donc φ' est croissante.

On en déduit que

— Si $x > a$, on a $\varphi'(x) > \varphi'(a)$.

Or $\varphi'(a) = f'(a) - f'(a) = 0$, et ainsi on vient de trouver que $\varphi'(x) > \varphi'(a) = 0$, et donc que φ est croissante, soit $\varphi(x) > \varphi(a)$.

Or $\varphi(a) = 0$ et on a donc,

$$\varphi(x) = f(x) - \left(f'(a)(x - a) + f(a) \right) > \varphi(a) = 0$$

qui est le résultat recherché.

— Si $x < a$, alors $\varphi'(x) < \varphi'(a) = 0$ et donc φ est décroissante et donc $\varphi(x) > \varphi(a) = 0$ et on obtient aussi le résultat souhaité. □

Exemples :


* Pour la fonction carré $f(x) = x^2$, on a facilement $f'(x) = 2x$ puis $f''(x) = 2 > 0$, ce qui montre que la fonction carré est convexe.

* Pour la fonction inverse, sur $\mathbb{R}_+^* =]0; +\infty[$, $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, puis $f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$ et la fonction inverse est aussi convexe sur \mathbb{R}_+^* .

Exercice 18 Soit f la fonction exponentielle.

1. Donner la convexité de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
3. En déduire que, pour tout réel x , $e^x > x$.

Définition On dit qu'une fonction f est **concave** lorsque $-f$ est convexe, ce qui est donc équivalent à dire que la courbe de f est toujours au-dessous de ses tangentes, ou encore que $f'' \leq 0$.



Définition Un **point d'inflexion** est un point où la courbe représentative d'une fonction traverse sa tangente.

En un tel point, la fonction change de convexité : de convexe à concave, ou le contraire.


Propriété Une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I admet un point d'inflexion au point d'abscisse a si, et seulement si, f'' s'annule en changeant de signe.

Démonstration: Par exemple $f''(x) \leq 0$, pour $x < a$ et $f''(x) \geq 0$ pour $x > a$, donc f concave avant a puis f convexe après. La fonction change ainsi de convexité en a . \square

Exemple à connaître : la fonction cube $f : x \mapsto x^3$ est telle que $f'(x) = 3x^2$ puis $f''(x) = 6x$.
On a $f''(0) = 0$ et

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	\emptyset	$+$

et donc en 0 la courbe de f admet un point d'inflexion.



Exercice 19 Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 0,5x + 1$.

1. Étudier la convexité de f sur \mathbb{R} .
2. Déterminer les abscisses des éventuels points d'inflexion de la courbe de f .

Exercice 20 Même exercice avec la fonction $g(x) = xe^x$, puis avec la fonction $h(x) = e^{-x^2}$.

Exercice 21 **QCM** Indiquer les bonnes réponses (une ou plusieurs par question).

1. La fonction dérivée de la fonction h définie sur \mathbb{R} par $h(x) = (2x^2 + 4x + 6)e^{5x+7}$ est $h'(x) =$:

- a) $(2x^2 + 4x + 6)e^{5x+7} + (4x + 4)e^{5x+7}$
- b) $2(5x^2 + 12x + 17)e^{5x+7}$
- c) $5e^{5x+7}(2x^2 + 4x + 6) + e^{5x+7}(4x + 4)$
- d) $5e^{5x+7}(4x + 4)$

2. La fonction k définie sur \mathbb{R} par $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ est :

- a) croissante sur \mathbb{R}
- b) croissante sur $[0; +\infty[$
- c) convexe sur $[0; +\infty[$
- d) convexe sur \mathbb{R} .

3. La fonction l définie sur \mathbb{R} par $l(x) = (x^2 - 5x + 4)^2$ admet

- a) un point d'inflexion
- b) deux points d'inflexion
- c) trois points d'inflexion
- d) quatre points d'inflexion

4. La fonction m définie sur \mathbb{R} par $m(x) = e^{x^2 - 2x + 3}$:

- a) admet pour dérivée $m' : x \mapsto 2(x - 1)m(x)$
- b) admet pour dérivée $m' : x \mapsto e^{2x - 2}$
- c) est concave sur \mathbb{R}
- d) est convexe sur \mathbb{R} .

Exercice 22 On considère la fonction g définie sur $[1; 5]$ dont la courbe représentative est tracée ci-contre.

1. Que vaut $g'(3)$?


- a) $g'(3) = -3$
- b) $g'(3) = -1$
- c) $g'(3) = \frac{3}{2}$
- d) $g'(3) = -\frac{3}{2}$

2. $g'(x) = 0$ pour : a) $x = 1$ b) $x = 2$ c) $x = 3$ d) $x = 4$

3. La fonction g semble convexe sur : a) $[2; 4]$ b) $[1; 3]$ c) $[1; 2]$ d) $[3; 5]$

4. g'' étant la dérivée de g' , on a : a) $g''(3) = 3$ b) $g''(2) = 0$ c) $g''(3) = 0$ d) $g''(4) = 0$

5. $g' \geq 0$ sur : a) $[1; 5]$ b) $[1; 2] \cup [4; 5]$ c) $[2; 4]$ d) $[2; 3] \cup [3; 4]$



Exercice 23 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 4x^3 - 15x^2 - 18x + 12$.

1. Dresser le tableau de variations de f . Préciser les limites.

2. Étudier la convexité de f .

3. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de f .

Exercice 24 Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$.

1. a) Déterminer la dérivée f' de f , puis sa dérivée seconde f'' .

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur \mathbb{R} . En déduire les variations de f' .

c) En déduire le signe de $f'(x)$ puis les variations de f . Préciser les limites en l'infini.

2. On note \mathcal{C} la courbe représentative de f dans un repère orthonormé et la droite $\mathcal{D} : y = x + 1$.

a) Préciser la position relative de \mathcal{C} et \mathcal{D} .

b) Déterminer les coordonnées des éventuels points de \mathcal{C} où la tangente à \mathcal{C} est parallèle à \mathcal{D} .

Exercice 25 Soit h la fonction définie par l'expression $h(x) = e^{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}$.

1. Préciser l'ensemble \mathcal{D}_h de définition de f .

2. Déterminer la fonction dérivée h' de h .

3. Étudier les variations de h .

4. Déterminer les équations des tangentes T_1 et T_4 à la courbe représentative de h aux points d'abscisses 1 et 4.

5. Déterminer les points d'intersection de T_1 et T_4 .

Exercice 26 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{e^x}{1 - x}$.


1. Déterminer $g'(x)$, puis montrer que g'' a pour expression $g''(x) = \frac{e^x(x^2 - 4x + 5)}{(1 - x)^3}$.

2. En déduire la convexité de g et les abscisses des éventuels points d'inflexion.
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0.
4. Montrer que, pour tout $x > 1$, on a $e^x \geq -2x^2 + 3x - 1$.

Exercice 27 D'après BAC ES, 2019

On donne ci-contre la courbe C représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $[0; 3]$. La droite \mathcal{D} est tangente à C au point d'abscisse 0 et passe par le point $A(0, 5; 1)$ et par l'origine du repère.

La tangente T à la courbe C au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses.



Partie A

1. Déterminer une équation de \mathcal{D} .
2. Donner la valeur de $f'(1)$. Justifier.
3. Proposer un intervalle sur lequel f semble concave.

Partie B La fonction f est définie sur $[0; 3]$ par l'expression $f(x) = 2xe^{-0,5x^2}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [0; 3]$, $f'(x) = (2 - 2x^2)e^{-0,5x^2}$.
2. Étudier les variations de f sur $[0; 3]$.
3. Déterminer la dérivée seconde de f et étudier sa convexité.

Partie C En Europe, les observateurs d'une maladie nécessitant une hospitalisation considèrent qu'ils peuvent modéliser par cette fonction f l'évolution du nombre de lits occupés par des malades pendant les trois mois d'hiver.

Pour tout x appartenant à l'intervalle $[0; 3]$, $f(x)$ représente le nombre de lits occupés, exprimé en million, à l'instant x , exprimé en mois.

Un journal affirme que cet hiver le nombre de lits occupés lors du pic de la maladie a dépassé le million. Que dire de cette affirmation ?