

Exercice 1 Des calculs de dérivées ...

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 + 2x - \frac{2}{x}$$

$$g(x) = \frac{2x+1}{x+2}$$

$$h(x) = xe^x$$

$$k(x) = (x+1)e^{-2x+1}$$

Exercice 2 ...et des dérivées de dérivées

Calculer la dérivée f' puis la dérivée seconde $f'' = (f')'$ des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}x^2 + 3$$

$$b) f(x) = e^{2x+1}$$

$$c) f(x) = e^{-x^2}$$

$$d) f(x) = \frac{e^x}{x}$$

Exercice 3 Position relative de deux courbes.

1. Étudier la position relative de la courbe de la fonction $f : x \mapsto x^2$ et de la droite $y = x + 1$.
Représenter graphiquement la situation.

2. Étudier la position relative des courbes des fonctions $f : x \mapsto \frac{x}{x+1}$ et $g : x \mapsto \frac{x}{x-1}$.

Étudier les variations (en précisant les limites et éventuelles asymptotes) de ces fonctions et tracer les deux courbes.

3. Étudier la position relative de la courbe de la fonction $f : x \mapsto e^x$ et de la droite $y = x$.
Représenter graphiquement la situation.

Exercice 4 Retour sur la fonction carré et sa parabole


On considère la fonction carré $f : x \mapsto x^2$ définie sur \mathbb{R} . On note \mathcal{C} sa courbe et T_a la tangente à sa courbe au point d'abscisse a .

- a) Donner l'équation de la tangente T_1 puis étudier la position relative de la courbe \mathcal{C} avec cette tangente.
- b) Étudier de même la position relative de la courbe \mathcal{C} avec ses tangentes T_2 , T_0 , et T_{-1} .
- c) Tracer dans un repère la courbe \mathcal{C} et ses tangentes.
- d) Généraliser les résultats précédents : montrer que \mathcal{C} est toujours au-dessus de toutes ses tangentes T_a .

Exercice 5 Pente sur un toboggan

La pente en un point à une courbe est la pente en ce point de sa tangente, ou encore le coefficient directeur de cette tangente.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} - 2x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



1. Justifier que f est continue sur $[0; 2]$.
2. Donner une expression de la fonction dérivée f' de f . Montrer que f' est aussi continue sur $[0; 2]$.
3. Donner la pente à la courbe en 0 et en 2.
4. Donner la pente de la courbe au point d'abscisse x . Comment varie cette pente? Dresser son tableau de variation.
5. Une norme impose que la pente d'un tel toboggan ne dépasse pas 1,5 en valeur absolue. Est-ce le cas ici?

Exercice 6 Soit f la fonction exponentielle.

1. Donner la convexité de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.
3. En déduire que, pour tout réel x , $e^x > x$.

Exercice 7 Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 0,5x + 1$.

1. Étudier la convexité de f sur \mathbb{R} .
2. Déterminer les abscisses des éventuels points d'inflexion de la courbe de f .

Exercice 8 Même exercice avec la fonction $g(x) = xe^x$, puis avec la fonction $h(x) = e^{-x^2}$.

Exercice 9 QCM Indiquer les bonnes réponses (une ou plusieurs par question).

1. La fonction dérivée de la fonction h définie sur \mathbb{R} par $h(x) = (2x^2 + 4x + 6)e^{5x+7}$ est $h'(x) =$:
 - a) $(2x^2 + 4x + 6)e^{5x+7} + (4x + 4)e^{5x+7}$
 - b) $2(5x^2 + 12x + 17)e^{5x+7}$
 - c) $5e^{5x+7}(2x^2 + 4x + 6) + e^{5x+7}(4x + 4)$
 - d) $5e^{5x+7}(4x + 4)$
2. La fonction k définie sur \mathbb{R} par $k(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ est :
 - a) croissante sur \mathbb{R}
 - b) croissante sur $[0; +\infty[$
 - c) convexe sur $[0; +\infty[$
 - d) convexe sur \mathbb{R} .
3. La fonction l définie sur \mathbb{R} par $l(x) = (x^2 - 5x + 4)^2$ admet
 - a) un point d'inflexion
 - b) deux points d'inflexion
 - c) trois points d'inflexion
 - d) quatre points d'inflexion
4. La fonction m définie sur \mathbb{R} par $m(x) = e^{x^2-2x+3}$:
 - a) admet pour dérivée $m' : x \mapsto 2(x - 1)m(x)$
 - b) admet pour dérivée $m' : x \mapsto e^{2x-2}$
 - c) est concave sur \mathbb{R}
 - d) est convexe sur \mathbb{R} .

Exercice 10 On considère la fonction g définie sur $[1; 5]$ dont la courbe représentative est tracée ci-contre.

1. Que vaut $g'(3)$?


a) $g'(3) = -3$	b) $g'(3) = -1$
c) $g'(3) = \frac{3}{2}$	d) $g'(3) = -\frac{3}{2}$
2. $g'(x) = 0$ pour :

a) $x = 1$	b) $x = 2$	c) $x = 3$	d) $x = 4$
------------	------------	------------	------------
3. La fonction g semble convexe sur :

a) $[2; 4]$	b) $[1; 3]$	c) $[1; 2]$	d) $[3; 5]$
-------------	-------------	-------------	-------------
4. g'' étant la dérivée de g' , on a :

a) $g''(3) = 3$	b) $g''(2) = 0$	c) $g''(3) = 0$	d) $g''(4) = 0$
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------
5. $g' \geq 0$ sur :

a) $[1; 5]$	b) $[1; 2] \cup [4; 5]$	c) $[2; 4]$	d) $[2; 3] \cup [3; 4]$
-------------	-------------------------	-------------	-------------------------



Exercice 11 On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 4x^3 - 15x^2 - 18x + 12$.

1. Dresser le tableau de variations de f . Préciser les limites.
2. Étudier la convexité de f .
3. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative de f .

Exercice 12 Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x + 1 + xe^{-x}$.

1. a) Déterminer la dérivée f' de f , puis sa dérivée seconde f'' .
 b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur \mathbb{R} . En déduire les variations de f' .
 c) En déduire le signe de $f'(x)$ puis les variations de f . Préciser les limites en l'infini.
2. On note \mathcal{C} la courbe représentative de f dans un repère orthonormé et la droite $\mathcal{D} : y = x + 1$.
 a) Préciser la position relative de \mathcal{C} et \mathcal{D} .
 b) Déterminer les coordonnées des éventuels points de \mathcal{C} où la tangente à \mathcal{C} est parallèle à \mathcal{D} .

Exercice 13 Soit h la fonction définie par l'expression $h(x) = e^{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}$.

1. Préciser l'ensemble \mathcal{D}_h de définition de f .
2. Déterminer la fonction dérivée h' de h .
3. Étudier les variations de h .
4. Déterminer les équations des tangentes T_1 et T_4 à la courbe représentative de h aux points d'abscisses 1 et 4.
5. Déterminer les points d'intersection de T_1 et T_4 .

Exercice 14 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{e^x}{1-x}$.

1. Déterminer $g'(x)$, puis montrer que g'' a pour expression $g''(x) = \frac{e^x(x^2 - 4x + 5)}{(1-x)^3}$.
2. En déduire la convexité de g et les abscisses des éventuels points d'inflexion.
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 0.
4. Montrer que, pour tout $x > 1$, on a $e^x \geq -2x^2 + 3x - 1$.


Exercice 15 D'après BAC ES, 2019

On donne ci-contre la courbe \mathcal{C} représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $[0; 3]$. La droite \mathcal{D} est tangente à \mathcal{C} au point d'abscisse 0 et passe par le point $A(0, 5; 1)$ et par l'origine du repère.

La tangente T à la courbe \mathcal{C} au point d'abscisse 1 est parallèle à l'axe des abscisses.

Partie A

1. Déterminer une équation de \mathcal{D} .
2. Donner la valeur de $f'(1)$. Justifier.
3. Proposer un intervalle sur lequel f semble concave.



Partie B La fonction f est définie sur $[0; 3]$ par l'expression $f(x) = 2xe^{-0,5x^2}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [0; 3]$, $f'(x) = (2 - 2x^2)e^{-0,5x^2}$.
2. Étudier les variations de f sur $[0; 3]$.
3. Déterminer la dérivée seconde de f et étudier sa convexité.

Partie C En Europe, les observateurs d'une maladie nécessitant une hospitalisation considèrent qu'ils peuvent modéliser par cette fonction f l'évolution du nombre de lits occupés par des malades pendant les trois mois d'hiver.

Pour tout x appartenant à l'intervalle $[0; 3]$, $f(x)$ représente le nombre de lits occupés, exprimé en million, à l'instant x , exprimé en mois.

Un journal affirme que cet hiver le nombre de lits occupés lors du pic de la maladie a dépassé le million. Que dire de cette affirmation ?