

Géométrie complexe et applications

I - Échauffements

Exercice 1 Dans le plan rapporté à un repère orthonormal,

- Placer les points $A(2; 4)$ et $B(-3, 5)$.
- Calculer les coordonnées de \overrightarrow{AB} et la longueur AB .
- Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.
- On note A' et A'' les symétriques de A respectivement par rapport à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées. Donner les coordonnées de A' et A'' .
- Déterminer les coordonnées des points M tels que $AM = BM$. Tracer ces points.

Exercice 2 Tracer le cercle trigonométrique et placer sur ce cercle les points associés aux angles

$$\pi, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{3\pi}{2}, \quad \frac{2\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{6}$$

Donner pour chaque angle les valeurs exactes de leur cosinus et sinus.

Exercice 3 Simplifier : $A = e^2 e^5$, $B = e^{2x} e^{2+3x}$, $C = \frac{(e^{3x})^2 e^{-2x}}{e^x}$, $D = e^x \frac{(e^{2x})^3}{\frac{e^{8x+1}}{e^x}}$

II - Plan complexe

Exercice 4 Placer les points A , B et C d'affixe respectif : $z_A = -1 - 2i$, $z_B = 4 - i$ et $z_C = \sqrt{2} + \frac{3}{2}i$.
Déterminer les longueurs OA , OB et OC et AB .

Exercice 5 Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z du plan complexe tels que $Z = z^2 + \bar{z}$ soit réel.

Exercice 6 Les points A , B et C ont pour affixe respective $-2 + i$, $3 + 3i$, $1 + \frac{11}{5}i$.

- Calculer les affixes des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
- En déduire que les points A , B et C sont alignés.
- Placer les points A , B et C .

Exercice 7 Les points A , B et C ont pour affixe respective $1 + \frac{1}{2}i$, $\frac{3}{2} + 2i$ et $-1 - \frac{11}{2}i$.
Montrer que les points A , B et C sont alignés.

Exercice 8 On considère dans le plan complexe les points A , B , C et D d'affixes respectives
 $z_A = 3 + i$, $z_B = 2 - 2i$, $z_C = 2i$ et $z_D = 1 + 5i$.
Faire une figure, puis montrer de deux façons différentes que $ABCD$ est un parallélogramme.

III - Module et argument d'un nombre complexe

Exercice 9 Placer les points dont les affixes sont les complexes suivants, puis en calculer le module et déterminer un argument : $z_1 = 2 + 2i$, $z_2 = 5$, $z_3 = 3i$, $z_4 = -6$, $z_5 = -1 + i$, $z_6 = \sqrt{3} + i$.

Exercice 10 Dans le plan complexe, A , B et C sont les points d'affixes :

$$z_A = 1 + i, \quad z_B = 4 + 5i, \quad z_C = 5 - 2i.$$

1. Montrer que $AB = AC$, puis que $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}$.
2. Déterminer l'affixe du point K tel que le quadrilatère $ABKC$ soit un rectangle.
3. a) Déterminer l'affixe du point G tel que le quadrilatère $AGBC$ soit un parallélogramme.
b) Vérifier que B est le milieu du segment $[GK]$.

Exercice 11 Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$\begin{aligned} & \bullet |z - 6i| = 3 \quad \bullet |z + 3 - 2i| < 2 \quad \bullet |z + 2| = |z - 3i + 1| \quad \bullet |2 - iz| = |z + 5| \quad \bullet \left| \frac{z + 2i}{z + 1 - 2i} \right| > 1 \\ & \bullet \arg(z) = \frac{\pi}{6} \quad \bullet |z - 3| = |z + 2i| \quad \bullet |z + 1 - 2i| < \sqrt{5} \quad \bullet \left| \bar{z} + \frac{i}{2} \right| = 4 \quad \bullet \arg(z + i) = \pi \end{aligned}$$

Exercice 12 Soit A , B et C les trois points d'affixes $z_A = 2i$, $z_B = 2 + i$ et $z_C = 1 - i$.
Montrer, de deux manières différentes, que ABC est un triangle rectangle en B .

IV - Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Exercice 13 Ecrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants :

$$\begin{aligned} & \bullet z_1 = 3 \quad \bullet z_2 = -4 \quad \bullet z_3 = 2i \quad \bullet z_4 = -1 + i \quad \bullet z_5 = -\sqrt{3} + i \\ & \bullet z_6 = -17 \quad \bullet z_7 = -6\sqrt{3} + 6i \quad \bullet z_8 = 5i \quad \bullet z_9 = \sqrt{6} + i\sqrt{2}. \end{aligned}$$

V - Exponentielle complexe

Exercice 14 Placer dans le plan complexe et écrire sous formes trigonométrique et algébrique les nombres complexes :

$$\bullet 3e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad \bullet \sqrt{2}e^{3i\frac{\pi}{4}} \quad \bullet 6e^{-i\frac{2\pi}{3}} \quad \bullet 5e^{i\frac{5\pi}{3}} \quad \bullet 2e^{i\frac{\pi}{4}} e^{-i\frac{3\pi}{2}} \quad \bullet \frac{3e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{-i\frac{2\pi}{3}}}$$

Exercice 15 Ecrire sous forme trigonométrique et exponentielle les nombres complexes :

$$\bullet 5 \quad \bullet 4 + 4i \quad \bullet \frac{3}{2}i \quad \bullet \frac{2}{1 - i} \quad \bullet \sqrt{3} - i \quad \bullet (\sqrt{3} - i)^2 \quad \bullet (\sqrt{3} - i)^3$$

Exercice 16 On donne $z_1 = e^{i\frac{\pi}{6}}$, $z_2 = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$, et $z_3 = \sqrt{2}e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

Donner sous la forme exponentielle puis algébrique les complexes : $z_1 z_2 z_3$, $\frac{z_1}{z_2 z_3}$, z_2^2 , z_3^6 .

Exercice 17 Simplifier l'expression, où $\theta \in \mathbb{R}$, $\left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^2$.

Etait-ce prévisible sans calcul ?

Exercice 18 Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

- $\arg(z - 3) = \frac{\pi}{3}$
- $\arg(-2z) = \frac{\pi}{4}$
- $\arg((1 + i)z) = 0$
- $\arg\left(\frac{1}{iz}\right) = \pi$
- $|z - 2i| = 3$
- $\arg\left(\frac{z + 2}{z - 2i}\right) = \frac{\pi}{2}$
- $|z + 1| = |z - 2i|$
- $|z + 1 - i| = \sqrt{2}$

Exercice 19 Ecrire le nombre complexe $(\sqrt{3} - i)^{10}$ sous forme algébrique.

Exercice 20 Calculer le module et un argument des complexes suivants, puis les écrire sous formes trigonométrique, exponentielle et algébrique :

$$z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2(1 + i)} \qquad z_2 = \frac{5(-1 + i)}{\sqrt{3} + i}$$

Exercice 21

- a) Ecrire sous forme trigonométrique les complexes $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = 1 - i$, et $Z = \frac{z_1}{z_2}$.
- b) Déterminer la forme algébrique de Z , et en déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Exercice 22

- a) Ecrire sous forme trigonométrique les complexes $z_1 = -1 - i$, $z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, et $Z = z_1 z_2$.
- b) Déterminer la forme algébrique de Z . En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

Exercice 23 On considère l'équation $z^2 - 2\cos(\theta)z + 1 = 0$, où θ est un réel donné dans $[0; 2\pi[$.

- a) Vérifier que le discriminant de cette équation est $\Delta = -4\sin^2(\theta)$.
- b) Résoudre alors dans \mathbb{C} l'équation proposée, en discutant suivant les valeurs de θ , en donnant les solutions sous formes exponentielle.

Exercice 24 Ecrire sous forme exponentielle les solutions de : $z^2 - 2z\sin^2\alpha + \sin^2\alpha = 0$.

Exercice 25

- a) Donner sous forme exponentielle les solutions de l'équation : $z^2 + z + 1 = 0$.
- b) Soit α un réel donné. Factoriser l'expression : $z^2 - e^{2i\alpha}$.
- c) En déduire les solutions de l'équation : $z^4 + z^2 + 1 = 0$.

Exercice 26 Résoudre dans \mathbb{C} l'équation $z^4 + 4z^2 - 21 = 0$.

Exercice 27 On considère l'équation du second degré $(E) : z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 1 = 0$.

1. Déterminer le discriminant Δ de cette équation. Écrire Δ sous forme exponentielle.
2. Donner un nombre complexe δ tel que $\delta^2 = \Delta$. Écrire δ sous forme algébrique.
3. Vérifier que les formules usuelles du second degré, $z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$ donnent bien deux solutions de (E) .

Exercice 28 (*Formules trigonométriques*)

Soit θ et θ' deux réels quelconques.

En exprimant de deux manières différentes le complexe $e^{i\theta}e^{i\theta'}$, exprimer $\cos(\theta + \theta')$ et $\sin(\theta + \theta')$ en fonction des cosinus et sinus de θ et θ' .

Exprimer de la même façon $\sin(2\theta)$ et $\cos(2\theta)$.

Exercice 29 En utilisant la notation exponentielle complexe et/ou les formules trigonométriques, exprimer en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$ les valeurs de :

- $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
- $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$
- $\cos(x + \pi)$
- $\sin(x + \pi)$
- $\cos(\pi - x)$
- $\sin(\pi - x)$

Exercice 30

1. a) Calculer $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ et en déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
b) Déterminer la valeur exacte de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ en remarquant que $\frac{\pi}{6} = 2 \times \frac{\pi}{12}$.
2. Exprimer $\frac{5\pi}{12}$ en fonction de $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{4}$. Déterminer alors les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$.

Exercice 31

1. x est un nombre réel. Ecrire la forme algébrique et la forme exponentielle de $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) e^{ix}$.
2. Utiliser la question précédente pour résoudre dans $] -\pi; \pi[$ l'équation $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.

Exercice 32 Factorisation par l'angle moitié.

- a) Factoriser e^{2x} dans la somme $e^x + e^{3x}$.
- b) Résoudre alors dans l'intervalle $] -\pi; \pi[$ l'équation : $\cos(x) + \cos(3x) = 0$.
- c) Résoudre de la même façon, dans l'intervalle $] -\pi; \pi[$, l'équation : $\sin(2x) + \sin(6x) = 0$.